



Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP o HPAI) en vacas

Se ha detectado una enfermedad nueva que afecta a las vacas, la Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP o HPAI). Se ha sido reportado en rebaños lecheros de Texas, Kansas, Michigan, Nuevo México, Idaho, Ohio, Dakota del Sur, Carolina del Norte. Según los datos actuales disponibles, aquí hay respuestas a algunas preguntas comunes:

¿Qué es la IAAP?

Origen:

- Se cree que las aves migratorias salvajes son la fuente inicial de infección de este virus en el ganado.

Riesgo de Transmisión:

- El contagio entre vacas no puede descartarse.
- El riesgo de transmisión de vaca a humano es sospechado pero los casos se mantienen muy bajos.

¿Cómo reducir el contagio?

Movimiento de ganado hacia California:

- Minimice la llegada de vacas de áreas afectadas.
- En abril de 2024, el Departamento de Alimentos y Agricultura de California (CDFA) añadió restricciones y aumentó los requerimientos de inspección para el desplazamiento de animales.

Implementaciones en la bioseguridad de la granja:

- Aísle los animales sospechosos de IAAP.
- Use equipo de protección personal (EPP; overol, gafas, guantes).
- Lave sus botas antes de entrar al rebaño.

¿Cuándo sospechar?

A nivel de rebaño

- Disminución de la producción de leche en tanque y del consumo de alimento en corrales.
- Más vacas de lo habitual en el corral del hospital.

A nivel de vacas

- Signos de enfermedad (deshidratadas, deprimidas, con fiebre).
- Leche anormal (color and consistencia) y heces anormales (suelta o pegajosa).

Tip: Las vacas mayores en mitad de la lactancia son las más afectadas. El ganado más joven también puede verse afectado.

Pic: Centro de diagnóstico de salud animal de la Universidad de Cornell



No es necesaria la despoblación

- Los casos actuales indican que sólo del 10 al 20% de las vacas en el rebaño se enferman.
- No ha habido muertes confirmadas por IAAP.

PARA CONFIRMAR UN CASO EN EL GANADO

- Oficial de Salud Animal de California
(916) 900-5002.
- Oficina local del distrito de CDFA.

Reduce el riesgo de transmisión

Protéjase:

- Use gafas, guantes y mascarilla cuando manipule animales enfermos o muertos y sus heces (ganado, cabras y pájaros). Desinfecte sus ropas.

Evite comidas posiblemente contaminadas:

- Comidas crudas o sin cocinar, especialmente queso y leche sin pasteurizar (crudo).

Si ha sido expuesto:

- Esté alerta a síntomas respiratorios y ojos rojos por 10 días.

Si se siente enfermo:

- Vaya al doctor si se siente enfermo.
- Aíslese de los demás, incluyendo de los miembros de su hogar.

Garantía de seguridad de la leche:

- Solamente la leche de animales sanos se puede comercializar para consumo humano
- La pasteurización es efectiva en matar el virus IAAP en la leche.

Medidas preventivas:

- Destruya la leche de los animales afectados.
- Pasteurice la leche afectada por IAAP o proveniente de animales sospechosos para alimentar becerros.